

ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) вызываются:

- ◆ бактериями (*сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз*)
- ◆ вирусами (*СПИД, герпес генитальный, гепатит В, С, генитальные бородавки*)
- ◆ простейшими (*трихомоноз*)
- ◆ дрожжеподобными грибами (*кандидоз*)
- ◆ паразитами и насекомыми (*лобковый педикулез, чесотка*).

Кандидоз вызывается дрожжеподобными грибами рода Кандида, откуда и получил свое название. В природе их известно около 80 видов, но наиболее опасными для человека являются примерно десять.

Кроме мочеполовой системы кандиды поражают дыхательную, пищеварительную и нервную системы, а также кожу и слизистые оболочки.



До эры антибиотиков и широкого применения синтетических гормонов кандидоз диагностировали сравнительно редко.

Сегодня кандиды высеиваются на слизистых оболочках человека в 10 раз чаще, чем 20-30 лет назад. Причем, кандиды легче развиваются на оболочках с поврежденным эпителием. Они прикрепляются к таким клеткам и благодаря своим ферментам проникают внутрь клетки. В результате

образуется своеобразная капсула - фагосома, в которой кандиды защищены от действий противогрибковых препаратов и могут длительно паразитировать на слизистой оболочке, разрушая ее клетки и вызывая воспаление.

Дрожжеподобные грибы рода Кандида являются условно болезнетворными для человека. Обнаружение их у здоровых людей, которые фактически являются их носителями, свидетельствует, что в большинстве случаев заболевают кандидозом не в результате заражения, а при определенных условиях.

Факторы развития инфекции:

- *снижение иммунитета;*
- *прием антибиотиков и синтетических гормонов;*
- *работа на производстве по выпуску антибиотиков, витаминных препаратов, кондитерских изделий.*

Урогенитальный кандидоз передается:

- *чаще всего половым путем;*
- *возможно заражение плода во время его прохождения через родовые пути матери.*

Кандидоз мочеполовой системы развивается нередко вместе с другими ИППП (хронической гонореей, трихомонозом, хламидиозом, уреаплазмозом и др.) или после их лечения.

Предрасполагают к развитию урогенитального кандидоза принимаемые антибиотики, кортикостероидные гормоны,

средства, подавляющие деление клеток, угнетающие иммунитет, а также такие состояния и болезни, как дебилность, диабет, туберкулез, злокачественные опухоли почек, беременность, климакс.

Как протекает инфекция?

Урогенитальный кандидоз обнаруживается как у мужчин, так и у женщин

У мужчин поражение мочеполовой системы проявляется воспалением кожи головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти. Больные ощущают жжение, зуд, нередко боль в области головки полового члена. Кожа в месте воспаления ярко-красная, отечная, покрыта серовато-белым налетом с неприятным запахом и эрозиями. При переходе инфекции на слизистую уретры появляются жжение, рези при мочеиспускании и утренние выделения из уретры слизистого или водянистого характера. Кандидозный уретрит редко проходит без последствий. Обычно лечение затягивается, осложняется простатитом, циститом и др.

У женщин кандидозная инфекция проявляется обычно поражением наружных половых органов и влагалища. У заболевших появляется зуд кожи, жжение в области наружных половых органов, увеличивается количество выделений белого цвета из влагалища и болезненность при половом акте.

ПОМНИТЕ! *От кандидоза не существует*

домашних и народных средств. Лечитесь только в специализированном медицинском учреждении!

Инфекция излечима при условии, если своевременно поставлен диагноз и правильно проводится лечение, в противном случае она опасна осложнениями.

Воспалительные заболевания как мужской, так и женской половой сферы:

у мужчин - воспаление яичек и их придатков, простатит ...

у женщин - нарушение менструальной функции, эрозия шейки матки, внематочная беременность ...

и, как завершение, - бесплодный брак.

Не слишком ли высокая цена за минутную слабость и легкомыслие?!

Как защититься?

УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИППП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ КАНДИДОЗА, ВАМ ПОМОГУТ:

- **верность в браке или одному сексуальному партнеру;**
- **использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь, презерватива и растворов хлоргексидина или мирамистина;**
- **забота о своем здоровье и здоровье своего партнера (осмотры у гинеколога, уролога, дерматовенеролога).**




ИППП

Если Вам не удалось избежать случайной половой связи, обязательно подстрахуйтесь: **не позже 2-х часов после сомнительного контакта** обратитесь в пункт индивидуальной профилактики, где Вам бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.

Возникли вопросы по проблеме? Обращайтесь!

УЗ «Минский областной кожно-венерологический диспансер» г.Минск ул. П.Бровки, 7.



Кандидоз