

ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) вызываются:

- ◆ бактериями (*сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз*)
- ◆ вирусами (*СПИД, герпес генитальный, гепатит В, С, генитальные бородавки*)
- ◆ простейшими (*трихомониаз*)
- ◆ дрожжеподобными грибами (*кандидоз*)
- ◆ паразитами и насекомыми (*лобковый педикулез, чесотка*).

Бактериальный вагиноз -

(гарднереллез) - это клинический синдром, развивающийся в результате замещения флоры влагалища анаэробной флорой.

У женщин, больных бактериальным вагинозом, лактобациллы, преобладающие в нормальной микрофлоре влагалища и продуцирующие перекись водорода, которая убивает патогенные микроорганизмы, замещаются анаэробными. Причем, количество их увеличивается в 100 и более раз.

Основными очагами инфекции являются влагалище, шейка матки и мочеиспускательный канал.

Инфекция относится к числу "новых", недостаточно изученных заболеваний женской половой сферы.

Кто больше всего подвержен заражению?

Бактериальным вагинозом болеет более 35% женщин, обращающихся в кожно-венерологический диспансер, 15-20% беременных женщин, 5-15% женщин с гинекологической патологией. Возбудитель заболевания выделен почти у каждой шестой женщины с воспалительными заболеваниями мочеполовых органов. Причем, болеют чаще женщины детородного возраста.

Частота выявления заболевания у мужчин, страдающих негонококковыми поражениями уrogenиталий, варьирует от 2,5 до 3,5%.

Пути передачи инфекции:

Основной путь передачи инфекции - половой.

Возможна передача инфекции новорожденному при прохождении его через родовые пути матери.

Риск заражения бактериальным вагинозом увеличивается:

- при частой смене половых партнеров;
- при абортах или выкидышах;
- при использовании внутриматочных спиралей (риск в 3 раза выше);
- при применении антибактериальных средств, угнетающих иммунитет.

Симптомы заболевания

Указывать на заболевание у женщин могут серо-молочные выделения с «рыбным» запахом. 20-30% больных женщин помимо выделений испытывают зуд и жжение. У некоторых больных признаки заболевания могут отсутствовать вовсе.

Бактериальный вагиноз - прямая угроза здоровью женщины и ее потомству

У женщин с бактериальным вагинозом в 2,5 - 3,8 раза чаще наблюдаются преждевременное излитие околоплодных вод и преждевременные роды, послеродовый эндометрит.

С этой инфекцией связывают развитие послеродовых и послеоперационных гнойно-септических осложнений, маточных кровотечений.



ПОМНИТЕ!

От бактериального вагиноза не

существует домашних и народных средств. Лечитесь только в специализированном медицинском учреждении!

Как защититься?

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИППП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА, ПОМОГУТ:

- *верность в браке или одному сексуальному партнеру;*
- *использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь, презерватива и растворов хлоргексидина или мирамистина;*
- *забота о своем здоровье и здоровье своего партнера (осмотры у гинеколога, уролога, дерматовенеролога).*


ИППП

Если Вам не удалось избежать случайной половой связи, обязательно подстрахуйтесь: **не позже 2-х часов после сомнительного контакта** обратитесь в пункт индивидуальной профилактики, где Вам бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.



Возникли вопросы по проблеме? Обращайтесь!

**УЗ «Минский областной кожно-венерологический диспансер»
г.Минск ул. П.Бровки, 7.**



Бактериальный вагиноз